

Medicingivning i daginstitutioner

Sundhedsstyrelsen har lavet en skrivelse vedr. medicingivning. Den kan læses ved at klikke på: http://www.sst.dk/Forebyggelse/Forebyggende_sundhedsordninger/Medicin.aspx

Skrivelsen vedrører hovedsageligt børn med *kroniske sygdomme* (astma, eksem, feberkrampe mv.), hvor der kan være behov for at daginstitutionen i perioder er behjælpelig med at give medicin. Institutionen påtage sig opgaven, men det forudsætter bl.a. en skriftlig instruks. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt med instruks på medicinpakningen, men i de tilfælde, hvor der er behov for en mere udførlig instruks, må forældrene bede egen læge om at udfærdige en sådan.

Når det gælder *akutte sygdomme*, hvor barnet efterfølgende har behov for medicin, er der ikke regler for, hvornår barnet må komme igen i institutionen. Børn må komme i daginstitution selvom de får medicin (f.eks. penicillin), hvis de ellers er raske og smittefri. For visse sygdomme er der regler for, hvor lang tid der skal gå, førend barnet må komme i institutionen: Børn med penicillinkrævende halsbetændelse må f.eks. møde i institutionen efter 2 døgn behandling med penicillin, såfremt de ellers er raske.

Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens "Smitsomme sygdomme hos børn,- Vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre", bør **"medicingivning i institutionstiden begrænses mest muligt. Når barnet efter akut, smitsom sygdom igen kommer i institutionen, bør eventuel fortsat medicin gives på tidspunkter uden for institutionstiden"**.

Det nævnes direkte i Vejledningen, at personalet **"ikke er uddannet til at observere og behandle syge børn"**.

Sundhedsstyrelsen præciserer endvidere: **"Giv ikke medicin, der ikke er ordineret af lægen"**.

Løvrigt skal man være opmærksom på, at barnet skal være helt rask, for at komme i institutionen, og jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning kunne **"deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning"**.

Man må opfordre forældrene til at spørge lægen, om det er muligt at lægge medicingivning på andre tidspunkter, eller om man evt. kan anvende en anden type medicin, der doseres på en anden måde. Ellers må forældrene holde barnet hjemme, til medicingivningen er overstået.

Birgitte Brinck
Børneungelæge